

定期予防接種の種類・接種方法

種類	対象者		標準的な接種期間・間隔		接種方法	
Hib 感染症 (ヒブ)	初回 追加	生後 2か月 ～4歳	初回 接種の 開始 時期	生後2～6か月の 場合	【期間】 初回接種開始時期が生後2～6か月 【間隔】 初回接種：27日(医師が認める場合 20日)～56日の間隔で3回 接種 追加接種：初回接種終了後7～13 か月までの間隔で1回接種	初回接種：1歳未満で、27日(医師が認める場合20日)以上 あけて3回接種 ※初回接種2回目及び3回目は1歳未満で接種し、 それを超えた場合は接種しない。この場合、 追加接種は初回接種の最後の接種終了後、 27日(医師が認める場合20日)以上あけて1回 接種 追加接種：初回接種終了後、7か月以上あけて1回接種
				生後7～11か 月の場合	【間隔】 初回接種：27日(医師が認める場合 20日)～56日の間隔で2 回接種 追加接種：初回接種終了後7～13 か月までの間隔で1回接種	初回接種：1歳未満で、27日(医師が認める場合20日)以上 あけて2回接種 ※初回接種2回目は1歳未満で接種し、それを 超えた場合は接種しない。この場合、追加 接種は初回接種の最後の接種終了後、27日 (医師が認める場合20日)以上あけて1回接種 追加接種：初回接種終了後、7か月以上あけて1回接種
				1～4歳 の場合	1回接種	1回接種
小児の 肺炎球菌 感染症	初回 追加	生後 2か月 ～4歳	初回 接種の 開始 時期	生後2～6か月の 場合	【期間】 初回接種開始時期：生後2～6か月 追加接種：1歳～1歳2か月 【間隔】 初回接種：1歳未満で、27日以上あ けて3回接種 追加接種：1歳～1歳2か月の間に 初回接種終了後60日以 上あけて、1歳以降に 1回接種	初回接種：2歳未満で、27日以上あけて3回接種 ※初回接種2回目及び3回目は2歳未満で接種 し、それを超えた場合は接種しない(追加接 種は可能) ※初回接種2回目が1歳を超えた場合、3回目は 接種しない(追加接種は可能) 追加接種：初回接種終了後60日以上あけて、1歳以降に 1回接種
				生後7～11か 月の場合	【間隔】 初回接種：1歳までに、27日 以上あけて2回接種 追加接種：1歳以降に、 初回接種終了後60日以 上あけて1回接種	初回接種：2歳未満で、27日以上あけて2回接種 ※初回接種2回目は2歳未満で接種し、2歳を 超えた場合は接種しない(追加接種は可能) 追加接種：初回接種終了後60日以上あけて、1歳以降に 1回接種
				1歳の 場合	60日以上あけて2回接種	60日以上あけて2回接種
				2～4歳 の 場合	1回接種	1回接種
B型肝炎	1回目	1歳未満	【期間】生後2か月～8か月		1回接種	
	2回目		【期間】生後2か月～8か月 【間隔】1回目の接種終了後27日以上の間隔		1回接種	
	3回目		【期間】生後2か月～8か月 【間隔】1回目接種終了後139日以上の間隔		1回接種	
ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ (DPT-IPV)	1期 初回	生後3か月 ～7歳5か月	【期間】生後3～11か月 【間隔】20日～56日の間隔で3回接種		20日以上あけて3回接種	
	1期 追加		1期初回接種(3回)終了後、12～17か月		1期初回接種(3回)終了後、6か月以上あけて1回接種	
ジフテリア 破傷風 (DT)	2期	11～ 12歳	11歳		1回接種	
結核 (BCG)	1歳未満		生後5～7か月		1回接種	
麻しん 風しん (MR)	1期	1歳		接種可能な年齢のうちできるだけ早く1回接種		
	2期	小学校就学前の1年間		接種可能な年齢のうちできるだけ早く1回接種		
水痘 (水ぼうそう)	初回	1～2歳	1歳～1歳2か月の間に1回接種		1回接種	
	追加		初回接種終了後6～11か月あけて1回接種		初回接種終了後、3か月以上あけて1回接種	
日本脳炎	1期 初回	生後6か月 ～7歳5か月	【期間】3歳 【間隔】6日～28日間隔で2回接種		6日以上あけて2回接種	
	1期 追加		【期間】4歳 【間隔】1期初回接種終了後、 おおむね1年あけて1回接種		1期初回接種終了後、6か月以上あけて1回接種	
	2期	9～ 12歳	9歳		1回接種	
*日本脳炎特例対象者(H7.4.2～H19.4.1生)は、4歳～20歳未満の間に4回接種のうち不足分を接種する。ただし、2期は9歳以上で接種。 (H19.4.2～H21.10.1生)は、9歳～13歳未満の間に4回接種のうち不足分を接種する。						
ヒトパピローマ 感染症予防 (HPV)	小学6年～ 高校1年 女子		中1女子		3回接種	