

定期予防接種の種類・接種方法

種類	対象者		標準的な接種期間・間隔	接種方法
小児の肺炎球菌感染症	初回 追加	生後2か月～4歳	初回接種の開始時期 生後2～6か月の場合	【期間】 初回接種開始時期：生後2～6か月 追加接種：1歳～1歳2か月 【間隔】 初回接種：1歳未満で、27日以上あけて3回接種 追加接種：1歳～1歳2か月の間に初回接種終了後60日以上あけて、1歳以降に1回接種 初回接種：2歳未満で、27日以上あけて3回接種 ※初回接種2回目及び3回目は2歳未満で接種し、それを超えた場合は接種しない(追加接種は可能) ※初回接種2回目が1歳を超えた場合、3回目は接種しない(追加接種は可能) 追加接種：初回接種終了後60日以上あけて、1歳以降に1回接種
			生後7～11か月の場合	【間隔】 初回接種：1歳未満で、27日以上あけて2回接種 追加接種：1歳以降に、初回接種終了後60日以上あけて1回接種 初回接種：2歳未満で、27日以上あけて2回接種 ※初回接種2回目は2歳未満で接種し、2歳を超えた場合は接種しない(追加接種は可能) 追加接種：初回接種終了後60日以上あけて、1歳以降に1回接種
			1歳の場合	60日以上あけて2回接種 60日以上あけて2回接種
			2～4歳の場合	1回接種 1回接種
B型肝炎	初回	1歳未満	【期間】生後2か月～8か月 【間隔】27日以上	27日以上あけて2回接種
	追加		【期間】生後2か月～8か月 【間隔】1回目接種終了後139日以上の間隔	1回接種
ロタウイルス感染症(ロタウイルス)			【期間】 初回接種開始時期：生後2か月～出生14週6日後まで	
	ロタリックス	出生6週～24週	【間隔】 27日以上あけて2回経口投与	2回接種
	ロタテック	出生6週～32週	【間隔】 27日以上あけて3回経口投与	3回接種
5種混合ジフテリア百日咳破傷風ポリオ Hib(DPT-IPV-Hib)	1期初回	生後2か月～7歳5か月	【期間】生後2～7か月(令和6年4月以降開始) 【間隔】20日～56日の間隔で3回接種	20日以上あけて3回接種
	1期追加		1期初回接種(3回)終了後、6～17か月	1期初回接種(3回)終了後、6か月以上あけて1回接種
ジフテリア破傷風(DT)	2期	11～12歳	11歳	1回接種
結核(BCG)	1歳未満		生後5～7か月	1回接種
麻しん風しん(MR)	1期	1歳		接種可能な年齢のうちにできるだけ早く1回接種
	2期	小学校就学前の1年間		接種可能な年齢のうちにできるだけ早く1回接種
水痘(水ぼうそう)	初回	1～2歳	1歳～1歳2か月の間に1回接種	1回接種
	追加		初回接種終了後6～11か月あけて1回接種	初回接種終了後、3か月以上あけて1回接種
日本脳炎	1期初回	生後6か月～7歳5か月	【期間】3歳 【間隔】6日～28日の間隔で2回接種	6日以上あけて2回接種
	1期追加		【期間】4歳 【間隔】1期初回接種(2回)終了後、おおむね1年あけて1回接種	1期初回接種(2回)終了後、6か月以上あけて1回接種
	2期	9～12歳	9歳	1回接種

★予防接種を受ける際の注意事項

※すべて個別接種です。通年(4～3月)で接種できます。

※四種混合は令和8年度より定期接種から除外されています。

※接種料：無料(ただし、対象年齢以外の接種は、任意接種となり全額自己負担となります。)

※接種の際は、母子健康手帳、予診票を記入の上、接種する医療機関へ提出してください。

※太子町、たつの市、姫路市の実施医療機関以外で定期予防接種を希望される場合は、事前に申請が必要ですので、

さわやか健康課(保健福祉会館内)にご連絡ください。